




Antiparasitario interno y externo
Para gatos pequeños hasta 4 kg de peso
Para gatos pequeños hasta 8 kg de peso



Gatos



Registro ICA No. 7328 MV	Vida Útil: 24 Meses	Fabricante: Bayer KVP Pharma - Alemania															
Presentaciones de Venta:	Caja x 1 pipeta de 0,4 y 0.8 mL																
Concepto Toxicológico: MP-13859-2006	Licencia Ambiental: No aplica																
Clasificación Toxicológica: MEDIANAMENTE TÓXICO (Categoría III) CUIDADO (Azul)																	
Composición garantizada:	Cada mL contiene: Imidacloprid 100 mg Moxidectina 10 mg Excipientes c.s.p..... 1 mL																
Indicaciones:	En gatos para el tratamiento y control de las pulgas (<i>Ctenocephalides felis</i>), tratamiento de la infestación por el ácaro del oído (<i>Otodectes cynotis</i>), tratamiento de las infestaciones por nematodos gastrointestinales (larva L4, adultos inmaduros y maduros de <i>Toxocara cati</i> y <i>Ancylostoma tubaeforme</i>) y control de la infestación por el parásito del corazón (larvas L3 y L4 de <i>Dirofilaria immitis</i>). Es recomendable establecer una rutina de tratamiento aplicando el producto el mismo día cada mes.																
Dosificación y vía de aplicación	<p>Esquema de dosis</p> <p>Las dosis mínimas recomendadas son de 10 mg/kg de imidacloprid y 1 mg de moxidectina una vez al mes mediante aplicación tópica.</p> <p>No aplicar el producto en caso de existir irritación o lesiones en la piel o basados en una evaluación riesgo-beneficio. De acuerdo al tamaño y peso del gato se recomienda el siguiente esquema de dosificación según la presentación comercial disponible.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Peso del gato (Kg)</th> <th>Tamaño de pipeta a ser usado</th> <th>Volumen de la pipeta (mL)</th> <th>Imidacloprid (mg)</th> <th>Moxidectina (mg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>> 1 ≤ 4 Kg</td> <td>ADVOCATE® Para gatos pequeños hasta 4 Kg de peso</td> <td>0.4</td> <td>40</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>> 4 – 8 Kg</td> <td>ADVOCATE® Para gatos grandes de 4 hasta 8 Kg peso</td> <td>0.8</td> <td>80</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table> <ol style="list-style-type: none"> 1. Retire la pipeta del empaque y aplique el contenido total de la pipeta de acuerdo a la siguiente tabla de ilustración. 2. Sosteniendo la pipeta en posición vertical retire la tapa de la pipeta. 3. Coloque la tapa en posición inversa sobre la punta de la pipeta y gire la tapa para romper el sello y retire la tapa de la pipeta. <div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div> <ol style="list-style-type: none"> 4. El gato debe estar en posición de pie. Separe la capa de pelo sobre la base de la nuca hasta hacer visible la piel y coloque la punta de la pipeta sobre la piel expuesta y vacíe el contenido completo. 		Peso del gato (Kg)	Tamaño de pipeta a ser usado	Volumen de la pipeta (mL)	Imidacloprid (mg)	Moxidectina (mg)	> 1 ≤ 4 Kg	ADVOCATE® Para gatos pequeños hasta 4 Kg de peso	0.4	40	4	> 4 – 8 Kg	ADVOCATE® Para gatos grandes de 4 hasta 8 Kg peso	0.8	80	8
Peso del gato (Kg)	Tamaño de pipeta a ser usado	Volumen de la pipeta (mL)	Imidacloprid (mg)	Moxidectina (mg)													
> 1 ≤ 4 Kg	ADVOCATE® Para gatos pequeños hasta 4 Kg de peso	0.4	40	4													
> 4 – 8 Kg	ADVOCATE® Para gatos grandes de 4 hasta 8 Kg peso	0.8	80	8													

	<p>No aplique la solución en ningún lugar en donde pueda derramarse sobre el costado de la mascota.</p>  <p>El tratamiento en el lugar de aplicación en el gato (nuca) minimiza la oportunidad de ingestión por el acicalamiento de la mascota. En hogares donde exista más de un gato se recomienda mantenerlos separados por 30 minutos posteriores a la aplicación para evitar el lamido en el sitio de aplicación. En el sitio de aplicación posterior al uso de ADVOCATE® puede observarse una apariencia húmeda del pelo, pelo tieso, piel rosada o ligeros residuos de polvo. Esto es temporal y no afecta la seguridad y la efectividad del producto. El lavado con Shampoo 90 minutos después de aplicado el tratamiento no reduce la efectividad ni la seguridad de ADVOCATE® en la prevención del gusano del corazón. El lavado con Shampoo o la inmersión del agua 4 días después de la aplicación del tratamiento no reduce la efectividad de ADVOCATE® gatos en el tratamiento de infestaciones por pulgas. Sin</p>
Modo de acción	<p>Imidacloprid tiene una alta afinidad por los receptores de la acetilcolina nicotínicos en la región postsináptica del sistema nervioso central de los insectos. La inhibición de la transmisión colinérgica interrumpe la transmisión nerviosa normal de los parásitos, lo que resulta en la parálisis y la muerte. Debido a su débil afinidad por los receptores de los mamíferos y a la baja penetración de la barrera hematoencefálica, Imidacloprid tiene una actividad farmacológica mínima en los mamíferos. La moxidectina interactúa con el canal de cloruro mediada por el ácido gamma-aminobutírico (GABA) y glutamato, lo que resulta en la apertura de los canales de cloruro en las conexiones postsinápticas permitiendo el flujo de iones y de inducir un estado de reposo irreversible. Esto provoca una parálisis flácida de los parásitos, causando la muerte o la expulsión. Debido a las propiedades de la fórmula, Imidacloprid se distribuye en toda la superficie de la piel del gato matando las pulgas por contacto, sin necesidad de que esta pique, mientras que la moxidectina se absorbe por la piel de los animales alcanzando niveles plasmáticos eficaces contra ácaros y nematodos.</p>
Precauciones	<p>No usar en gatos menores de 9 semanas de edad. Consulte al veterinario antes de usar el producto en hembras lactantes y gestantes, gatos menores de 1 kg y animales débiles o enfermos. No comer, beber y fumar durante la aplicación del producto. Lávese las manos después de utilizar el producto. Evite el contacto directo con la piel. En caso de contacto con la piel y mucosas lave la parte afectada inmediatamente con agua y jabón. Si tiene contacto con los ojos lave con abundante agua. Evite que el contenido de la pipeta o la dosis aplicada entre en contacto con los ojos, la boca y/o otros animales. No permita que los animales recién tratados entren en contacto con otros animales. ADVOCATE® no debe tener contacto con superficies de agua por sus efectos nocivos en los organismos acuáticos, el imidacloprid y la moxidectina son altamente tóxicos para los organismos acuáticos. No administrar junto a otro antiparasitario tipo lactona macrocíclica.</p> <p>“El fabricante garantiza que las características fisicoquímicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que mediante registro oficial de venta se verificó que es apto para los fines aquí mencionados de acuerdo con las indicaciones de empleo”.</p> <p>Deshacerse de los envases vacíos y sus residuos a cargo de la normatividad ambiental vigente de gestión integral residuos peligrosos.</p> <p>En caso de emergencia por ingestión o contacto en humanos, derrame, incendio, explosión o accidente, favor llamar a Cisproquim: Colombia: 01-8000-916012, Ecuador: 1-800-59-3005</p>
Manejo de casos de intoxicación:	<p>En caso de intoxicación en humanos llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele una copia de esta etiqueta.</p> <p>En caso de intoxicación del animal llame al Médico Veterinario.</p> <p>Por no poseer antídoto específico, el tratamiento es sintomático.</p>
Precesiones especiales de conservación	<p>Manténgase fuera del alcance y vista de los niños.</p> <p>Conservar a una temperatura entre 15 °C – 30 °C , p rotegido de la luz directa del sol.</p> <p>No usar después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta y la caja.</p>
Material de empaque:	<p>Caja de cartón conteniendo un sachet con una pipeta.</p>

*Todas las marcas, avisos comerciales, diseños y demás signos distintivos son propiedad de BAYER, El uso no autorizado de los mismos queda prohibido expresamente y constituye una vulneración de los derechos de autor, derechos de marca y derechos de propiedad industrial.