

Drontal®

Gatos

Antiparasitario de amplio espectro



Registro ICA No. 5127 DB	Vida Útil: 60 Meses	Fabricante: Bayer KVP Pharma - Alemania										
Presentaciones de Venta: Caja x 2 Tabletas - Display x 12 Cajas x 2 Tab.												
Concepto Toxicológico: No Aplica		Licencia Ambiental: No Aplica										
Composición garantizada:	Composición garantizada: Cada tableta de 339 mg contiene: Pamoato de Pirantel (equivalente a 80 mg de Pirantel base) 230 mg Praziquantel 20 mg											
Indicaciones:	Es un antiparasitario interno de amplio espectro para gatos, indicado para controlar formas adultas y larvianas de los nematodos y cestodos que comúnmente afectan a los gatos: <i>Ancylostoma brasiliense</i> , <i>Ancylostoma tubaeforme</i> , <i>Echinococcus multilocularis</i> , <i>esocestoides spp.</i> (especies no descritas en Chile), <i>Joyeuxiella pasqualei</i> , (no descrita en Argentina y Chile), <i>Toxocara cati</i> , <i>Toxascaris leonina</i> , <i>Dipylidium caninum</i> , <i>Taenia spp.</i>											
Dosificación y duración del Tratamiento.	Administrar 1 tableta por cada Kg de peso vivo en una sola toma. En infestaciones confirmadas debe realizarse una desparasitación inmediata con repetición a las 3 semanas. 1 tableta por cada 4 kg de peso vivo administrada mediante dosis única. Repetir a los 15 días.											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Peso</th> <th>Tabletas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,0 - 2,0 kg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2,1 - 4,0 kg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4,1 - 6,0 kg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6,1 - 8,0 kg</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Peso	Tabletas	1,0 - 2,0 kg		2,1 - 4,0 kg		4,1 - 6,0 kg		6,1 - 8,0 kg	
Peso	Tabletas											
1,0 - 2,0 kg												
2,1 - 4,0 kg												
4,1 - 6,0 kg												
6,1 - 8,0 kg												
Contraindicaciones y efectos secundarios:	No se conocen efectos secundarios. Pueden observarse signos de intoxicación a dosis 5 veces por encima de la recomendada pudiendo presentarse vómito como signo principal. No tratar gatos con un peso inferior a 1 kg ni animales muy débiles. No administrar en gatas preñadas.											
Recomendaciones para el control de parásitos:	Desparasite a todos los perros y gatos de la casa el mismo día. Comenzar el tratamiento desparasitante de los gatitos a las 6 semanas de nacidos y continuarlo a las 8, 10 y 12 semanas. Entre 3 y 6 meses de edad desparasitar una vez al mes. Los gatos mayores de 6 meses y los gatos adultos se deben desparasitar cada 3 meses. Las gatas se deben desparasitar antes de la monta. No administrar a gatas preñadas. "VENTA BAJO FÓRMULA / RECETA DEL MÉDICO VETERINARIO" MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS											
Administración:	Directamente en la boca de la mascota o mezclado con la comida. No requiere dieta especial.											
Almacenamiento:	Consérvese entre 15° y 30°C											
Material de empaque:	Caja de cartón, con ambos extremos de cierre manual. Display con cierre automático en la base y manual en la parte superior, adicional tiene una zona de precorte en la parte baja que funciona como dispensario.											

*Todas las marcas, avisos comerciales, diseños y demás signos distintivos son propiedad de BAYER, El uso no autorizado de los mismos queda prohibido expresamente y constituye una vulneración de los derechos de autor, derechos de marca y derechos de propiedad industrial.